

Překvapení z Egypta

Nemocnice Podlesí, a.s.

Třinec

Vojnarová Marcela

Juřenová Eva

Kazuistika

- Muž 65 let
- Na konci října 2017 na dovolené v Egyptě se při pádu poranil na levém bérce
- Rána ošetřena hotelovým lékařem- sutura rány → vývoj flegmóny a otoku
- Hospitalizace 2 dny → rána rozpuštěna a nasazeny ATB
- Na Doppler UZV hluboká žilní trombóza
- 3.11.2017 byl převezen do Hurghády → zaveden kavální filtr pod a. renalis


Foto kaválního filtru



Návrat do ČR

- 5.11.2017 návrat do ČR → hospitalizace na chir. odd. spádové nemocnice
- LDK s masivním otokem → ATB (Amoksiklav, Metronidazol, Ciprofoxacin)
- Doplněno CT vyšetření → Pseudoaneurysma dist. a. poplitea, anatomické poměry deformované, na přední 1/3 bérce nález cizího tělesa cca 13 x 1 cm, nektrastní a obklopeno krví
- 15.11.2017 po tel. domluvě převezen do Nemocnice Podlesí, a.s. v Třinci



Foto CT vyšetření





Operace

- Na bérce dlouhá paratibiální incize od kloubní štěrbině do proximální 1/3 bérce, pulzující PSA (11 x 4 cm) → absces (kultivace)
- Uprostřed PSA je cizí těleso → dřevěný trn dlouhý 13 cm o průměru 1 cm
- V místě průniku trnu je nekrotický defekt (3 x 2 cm) → incize a extrakce cizího tělesa, nekrektomie v místě cizího tělesa, výplach peroxidem a betadinou
- Revize popliteální oblasti, cizí těleso lacerovalo APO → přerušena, stěna nekvalitní a nevhodná pro rekonstrukci
- Rekonstrukci lze provést femoro-tibiálním bypassem (odběr VSM z pravého stehna v délce 20 cm) → opracování graftu a našíť reverzně → bypass se rozvíjí a pulzace hmatné -redony a zašíť rány
- V místě vstupu trnu zavedena podtlaková drenáž - VISTA


Foto





Foto



Foto



Foto



Foto

21.11.2017 – převaz Visty



Další průběh

- 28.11.2017 extrakce kaválníhoho filtru z pravé jugulární žíly



Další průběh

- 1.12. 2017 překládán do spádové nemocnice



Další průběh

- 24.01.2018 kontrola na chirurgické ambulanci



Závěr

- Poranění končetiny ostrým předmětem může vést k poškození nervově - cévního svazku a při nevhodné diagnostice a léčbě to může způsobit trvalou invaliditu nebo dokonce ohrožit na životě.
- Chceme tímto ukázat, že i v dnešní době, plné moderních vyšetřovacích metod, může trvat dlouhou dobu než přijdeme na příčinu potíží.

Děkujeme za pozornost

