





Endoprotéza bedrového kĺbu ako príčina akútnej končatinovej ischemie


Sivák J., Vozár M.
Oddelenie diagnostickej a
intervenčnej rádiológie
SUSCCH , Banská Bystrica






KAZUISTIKA

- 70 r. ♀
- DM II.typu, st.p.TEP bilat. (vľavo 4-5x reoperácia)
- 27.6.2017 – hospitalizovaná v spáde ako ALI I.sin.
S2a – Heparin 5000 IU, vazodilat. inf. liečba,
analgetická liečba
- 28.6.2017 – preklad na naše pracovisko za účelom
EVL




CTAG









- **Cross-over prístup (retrográdna punkcia AFC I.dx.)**
- **Mechanická trombektómia (ROTAREX) + aspirácia (Penumbra, Export)**
- **24h regionálna trombolýza (1mg/hod)**










KONTROLNÁ DSA po 24H TL











TIS: 0,8
TIB: 0,8

IR
I




08:49-DST-1.3.12.2.110...

12:08:52 29.6.2017
SUSCCH a.s, B. Bystrica



20
SIEMENS
CH6-2 / Abdomen
2D
THI / 2.50 MHz
4 dB / DR 60
SC Off
Map I / RS 1
C
VEL / 3.1 MHz
0 dB / Flow Gen
PRF 1563 / F 2
D
PW / 2.5 MHz
70 dB / DR 55
PRF 7102 / F 213
+Vel=288.4 cm/s



8fps 9cm



- LMWH + duálna antiagregačná liečba
- Prepustená do ambulantnej starostlivosti
30.6.2017
- Včasná instent(graft) reoklúzia – konzervatívny postup (13.7.2017)
- I-F bypass? (v prípade progresie kliniky)



EVL ALI

- EVL predstavuje efektívnu metódu liečby ALI
- ↓ morbidita a mortalita
- Široké spektrum možností rekanalizácie (lok. trombolýza, aspirácia, mechanická trombektómia, PTA+ PVI)
- EVL a chirurgická liečba – komplementárne, nie konkurenčné metódy liečby ALI



ĎAKUJEM ZA POZORNOST

